

PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII

Badanie w godzinach popołudniowych.

1. W dniu badania można zjeść lekkie śniadanie, następnie należy powstrzymać się od jedzenia, zakończyć picie płynów na cztery godziny przed planowanym badaniem. W dniu badania nie zaleca się spożywania napojów mlecznych.
2. Przed gastroskopią zazwyczaj nie ma potrzeby odstawiania leków przeciwkrzepliwych, można zapytać się o to lekarza kierującego lub prowadzącego leczenie przeciwkrzepliwe.
3. Celem jak najlepszej oceny endoskopowej conajmniej 2 tygodnie przed planowanym badaniem wskazane jest odstawienie (jeżeli były wcześniej stosowane) leków typu inhibitory pompy protonowej - o ile lekarz nie zaleci inaczej.
4. W przypadku gdy przed gastroskopią były stosowane antybiotyki (nie dotyczy kropli do oczu i maści skórnych) zalecane jest również, by wykonać gastroskopię nie wcześniej niż miesiąc po zakończeniu leczenia - o ile lekarz nie zaleci inaczej.
5. Nie należy przynosić do pracowni rzeczy wartościowych lub biżuterii, ponieważ personel nie odpowiada za ich zniszczenie lub zagubienie.